






# Patata 2024

## Conduzione e gestione della prova

- **Semina:** 7 giugno
- **Cavatura:** a mano il 30 ago: 3 piante/varietà; a macchina dal 8 al 22 settembre
- **Terreno:** medio impasto
- **Coltura precedente:** prato
- **Sesto di impianto:** 78 x 40 cm. Per ogni varietà sono stati messi a dimora 210 tuberi/cv
- **Emergenza:** valori superiori al 90% nella maggior parte delle accessioni.
  
- **Concimazioni:**
  - **In autunno: digestato liquido (750 q/ha)** seguito da erpicatura
  - **Fine aprile:** Physiolith (correttivo calcico magnesiaco, CaO 36% MgO 1%) 400 kg/ha + Nutex Beta (inoculo di funghi micorrizici + Trichoderma)
  - **Alla semina localizzato:** NPK 15-5-20+2MgO+20SO3 600 kg/ha
  
- **Diserbo:**
  - **Post semina:** Pendimetalin + Clomazone + Aclonifen + Metobromuron
  
- **Difesa:**
  - Alla semina: Teflutrin (Force EVO)
  - 2 trattamenti per la Dorifora
  - 3 trattamenti per la Peronospora e l'Alternaria
  
- **Irrigazione:** localizzata con ala gocciolante sulla fila con 13 interventi su allerta portale "Irriframe"

## Tipologia Culinaria “A-B”

<b>Alambra</b> (5)	<input checked="" type="checkbox"/> Emergenza elevata, pianta di medio vigore <input checked="" type="checkbox"/> Produttività media (65% di commerciale) <input checked="" type="checkbox"/> Tubero tondeggiante <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura buona <input checked="" type="checkbox"/> Buccia liscia, polpa giallo chiaro		
	Precoce <input checked="" type="checkbox"/> Occhi leggermente infossati <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di tuberi con spaccature <input checked="" type="checkbox"/> Bassa uniformità di pezzatura <input checked="" type="checkbox"/> Deformato elevato		
<b>AR 14-0334</b> (1)	<input checked="" type="checkbox"/> Epoca di maturazione precoce <input checked="" type="checkbox"/> Medio vigore		
	Precoce <input checked="" type="checkbox"/> Portamento prostrato <input checked="" type="checkbox"/> Produttività medio scarsa <input checked="" type="checkbox"/> Pochi tuberi di elevata pezzatura <input checked="" type="checkbox"/> Scabbia elevata <input checked="" type="checkbox"/> Spaccature da rizoctonia		
<b>Bernina</b> (4)	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta eretta, buon vigore <input checked="" type="checkbox"/> Produttività elevata <input checked="" type="checkbox"/> Polpa giallo intenso <input checked="" type="checkbox"/> Buccia rugosa tipo Jelly		
	Medio-precoce <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di sottocalibro e deformato <input checked="" type="checkbox"/> Sensibile ad alternaria <input checked="" type="checkbox"/> Elevata suscettibilità a peronospora sul tubero		
<b>El Beida</b> (27)	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta di vigoria medio elevata <input checked="" type="checkbox"/> Discreta produzione (61% di commerciale)		
	Tardiva <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di deformato con prominenza degli occhi <input checked="" type="checkbox"/> Polpa bianca (limitato interesse) <input checked="" type="checkbox"/> Calibro ridotto		
<b>Folk</b> (5)	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta di medio vigore <input checked="" type="checkbox"/> Produttività medio elevata <input checked="" type="checkbox"/> Polpa morbida		
	Medio-tardiva <input checked="" type="checkbox"/> Tubero di medio piccola pezzatura <input checked="" type="checkbox"/> Forma poco regolare <input checked="" type="checkbox"/> Rugginosità sulla superficie dei tuberi <input checked="" type="checkbox"/> Molte spaccature da rizoctonia		
<b>Libra</b> (3)	<input checked="" type="checkbox"/> Buona vigoria e % di emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Portamento semieretto <input checked="" type="checkbox"/> Elevata resa produttiva <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura medio elevata <input checked="" type="checkbox"/> Tubero ovale lungo <input checked="" type="checkbox"/> Buccia chiara, polpa gialla <input checked="" type="checkbox"/> Limitata presenza di scabbia e marcio alla cavatura	Resistente a scabbia comune	
	<input checked="" type="checkbox"/> Presenza di alternaria <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di maculatura ferruginea <input checked="" type="checkbox"/> Elevata suscettibilità a peronospora		

<b>Tipologia Culinaria “B”</b>		<b>Consistenza della polpa: semi-soda</b>	
		<b>Farinosità: poco farinosa</b>	
		<b>Usi: tutti gli usi</b>	
<b>Anissa (29)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Portamento eretto e elevata vigoria <input checked="" type="checkbox"/> Superficie rugosa <input checked="" type="checkbox"/> Polpa consistente		
Medio-tardiva	<input checked="" type="checkbox"/> Presenza di sotto calibro <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di deformato con proliferazione degli occhi <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di scabbia comune		
<b>Bellatrix (27)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Vigoria elevata <input checked="" type="checkbox"/> Produzione commerciale medio elevata <input checked="" type="checkbox"/> Superficie liscia		
intermedia	<input checked="" type="checkbox"/> Vigoria elevata <input checked="" type="checkbox"/> Produzione commerciale medio elevata		
<b>Corinna (4)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Buona emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta di medio vigore, semieretta <input checked="" type="checkbox"/> Buona pezzatura e produttività <input checked="" type="checkbox"/> Occhi superficiali <input checked="" type="checkbox"/> Interessante per la precocità <input checked="" type="checkbox"/> Sapore buono, polpa giallo crema		
Molto precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Suscettibile ad alternaria e marciume molle		
<b>Decibel (5)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore, eretta <input checked="" type="checkbox"/> Buona resa produttiva <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura buona, uniforme <input checked="" type="checkbox"/> Assenza di fiorone <input checked="" type="checkbox"/> Buccia liscia, polpa giallo chiaro		
Medio-Precoce	<input checked="" type="checkbox"/> 15% di sotto-calibro <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di scabbia e rizoctonia		
<b>Franca (4)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta di medio vigore, semieretta <input checked="" type="checkbox"/> Forma tondeggiante		
precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Produttività totale molto inferiore alla media <input checked="" type="checkbox"/> Contenuta resa commerciale <input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura piccola, elevata presenza di sottocalibro		


<p><b>Jelly (4)</b> Medio-tardiva</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta vigorosa, eretta</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ottima resa commerciale</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura media</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Occhi superficiali</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Polpa gialla</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adatta al bio</li> </ul>	<p>Bassa suscettibilità alla scabbia comune, peronospora e alternaria</p>	
<p><b>Jolene (1)</b> Medio-precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta semierette di buon vigore con ottima emergenza.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tubero ovale lungo di elevata pezzatura.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttività media</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buccia liscia di colore giallo chiaro.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Polpa gialla</li> </ul>	<p>Resistente ai nematodi</p>	
<p><b>Larissa (4)</b> Medio-precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta di medio vigore</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produttiva</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura media, regolare</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Polpa gialla</li> </ul>	<p>Bassa suscettibilità a scabbia comune Polivalente, alternativa a Monalisa</p>	
<p><b>Levante (1)</b> Intermedia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore, semieretta</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produzione elevata</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Polpa gialla, occhi superficiali</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Adatta alla coltivazione biologica</li> </ul>	<p>Pasta semi-farinosa, sapore eccellente Adatta a frittura e lunga conservazione. Alternativa a Monalisa</p>	
<p><b>Taormina (4)</b> Medio-precocie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Buona percentuale di commerciale</li> </ul>		
<p><b>Tipologia Culinaria “B-C”</b></p>			
<p><b>Donata (4)</b> Medio-precoce</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pianta di buon vigore, semieretta</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Produzione elevata</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pezzatura media, uniforme</li> </ul>	<p>Patate fritte Tipologia Jelly ma precoce</p>	

<b>Elland (28)</b> Tardiva	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta di vigoria medio elevata <input checked="" type="checkbox"/> Portamento eretto <input checked="" type="checkbox"/> Produttività elevata (1,8 kg/pianta)	Patate fritte	
	<input checked="" type="checkbox"/> Presenza di frutti fuori forma <input checked="" type="checkbox"/> Polpa bianca (limitato interesse)		
<b>Leonore (AR 13-1059) (1)</b> Medio-precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Portamento prostrato <input checked="" type="checkbox"/> Produttività medio scarsa <input checked="" type="checkbox"/> Pochi tuberi di elevata pezzatura <input checked="" type="checkbox"/> Scabbia elevata <input checked="" type="checkbox"/> Spaccature da rizoctonia		
	<input checked="" type="checkbox"/> Portamento prostrato <input checked="" type="checkbox"/> Produttività medio scarsa <input checked="" type="checkbox"/> Pochi tuberi di elevata pezzatura <input checked="" type="checkbox"/> Scabbia elevata <input checked="" type="checkbox"/> Spaccature da rizoctonia		
<b>Tipologia Culinaria “C”</b>		<b>Consistenza della polpa: Tenera</b>	
		<b>Farinosità: Molto farinosa</b>	
		<b>Usi: Fritte, gnocchi</b>	
<b>Armedi (1)</b> Medio-precoce	<input checked="" type="checkbox"/> Ottima emergenza <input checked="" type="checkbox"/> Pianta molto vigorosa, semieretta <input checked="" type="checkbox"/> Occhi superficiali <input checked="" type="checkbox"/> Polpa giallo chiaro <input checked="" type="checkbox"/> Resistente ai nematodi cisticoli	Pasta farinosa	
	<input checked="" type="checkbox"/> Pianta ancora verde a fine ciclo <input checked="" type="checkbox"/> Produttività totale sotto media <input checked="" type="checkbox"/> Elevata presenza di deformato		
<b>Lugano (1)</b> Intermedia	<input checked="" type="checkbox"/> Elevata vigoria <input checked="" type="checkbox"/> Polpa di media consistenza <input checked="" type="checkbox"/> Tubero allungato		
	<input checked="" type="checkbox"/> Pochi tuberi per pianta, ma di elevato calibro <input checked="" type="checkbox"/> Buccia rugginosa		


## Editori

(1) Agrico	(2) Den Hartigh	(3) HZPC	(4) Europlant	(5) Germicopa
(6) Grocep	(7) Danespo	(8) CPS Pustertaler	(9) Grocep	(10) J.Dunnett
(11) Stet-holland	(12) Agroplant	(13) Semagri	(14) Bernard Sas	(15) Plantera B.V.
(16) CREA CIN	(17) Bejo	(18) Caithness Potatoes Ltd	(19) Coop Cecab	(20) Cullen Allen
(21) Sarl Lsa/Lergleuz Earl	(22) Sarl Lsa/Roudaut	(23) Unipatas	(24) New Style Potatoes	(25) Meijer
(26) Royal Zap	(27) Bretagne Plants Innovation	(28) Cygnet PB	(29) Eureden	


### Produzione per pianta (g)



### Suddivisione della produzione per calibri



### Peso Medio calibro commerciale 45-75mm (g)



### Numero di tuberi commerciali (calibro 45-75 mm) a pianta

